

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Distretto di Scandiano
Pediatria di Comunità
ed Assistenza Neonatale

Il Responsabile

PER I GENITORI

Il PIDOCCHIO è ritornato..

può capitare che nel capo dei vostri figli si trovino pidocchi. Ricordate che:


- **Il pidocchio non vola e non salta.**
- **Non si trasmette dagli animali.**
- **Non seleziona la classe sociale.**
- **Colpisce i capelli puliti o sporchi.**
- **E' più frequente sui capelli lisci.**



Non vanno utilizzati trattamenti a carattere preventivo (se non c'è pidocchio o uova sul capo non serve usare prodotti specifici).

Quando c'è il pidocchio si può avere:
prurito, presenza di polvere secca, nera, residui grigiastri sul cuscino

COSA FARE SE SONO PRESENTI I PIDOCCHI O UOVA SUL CAPO



1. **Recarsi dal proprio medico per la conferma diagnostica e la riammissione dopo il trattamento.**
2. Mettere in atto tutte le misure di prevenzione del contagio di tutti i famigliari e di tutti quelli che hanno avuto contatti con il soggetto infestato.
3. Avvertire immediatamente la scuola e/o la comunità frequentata per poter attivare un efficace controllo da parte dei genitori sui propri figli

TRATTAMENTO DEL CAPO

Usare prodotti che contengono PIRETRINA SINERGIZZATA o PERMETRINA all'1% o DIMETICONE al 4%

Si sconsiglia l'uso degli shampoo; più efficaci risultano le mousse, i gel, le emulsioni e le lozioni.

In caso di recidive il trattamento di seconda scelta è il MALATHION (da utilizzare preferibilmente in bambini di età superiore ai sei anni).

Per facilitare il distacco delle uova dal fusto è preferibile sciacquare con una soluzione di 100gr di aceto in 1 litro di acqua; per una migliore efficacia tamponare i capelli con la stessa soluzione dopo il risciacquo per 15-30 minuti.

Distretto di Scandiano
Pediatria di Comunità ed Assistenza Neonatale
Via Martiri della Libertà, 6 - 42019 Scandiano (RE)
T. +39.0522.850.292/850.253 – Fax +39.0522.339.699
angelo.cigarini@ausl.re.it
rossella.palmieri@ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola,2 - 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354

Usare prodotti che contengono PIRETRINA SINERGIIZZATA o PERMETRINA all'1% o DIMETICONE al 4%

Si sconsiglia l'uso degli shampoo; più efficaci risultano le mousse, i gel, le emulsioni e le lozioni.

In caso di recidive il trattamento di seconda scelta è il MALATHION (da utilizzare preferibilmente in bambini di età superiore ai sei anni).

Per facilitare il distacco delle uova dal fusto è preferibile sciacquare con una soluzione di 100gr di aceto in 1 litro di acqua; per una migliore efficacia tamponare i capelli con la stessa soluzione dopo il risciacquo per 15-30 minuti.



In tutti i soggetti infestati va fatta la rimozione manuale delle uova o lendini, nel seguente modo:

- Dividendo i capelli bagnati e puliti in piccole ciocche.
- Pettinando le singole ciocche partendo dal cuoio capelluto fino alle punte con un pettine a denti stretti e poi dalle punte alla radice
- Pulendo frequentemente il pettine durante questa operazione
- Sfilando con le dita le uova rimaste o tagliando il singolo capello se le uova non si staccano facilmente.

Questa procedura va fatta ogni 4 giorni per almeno 2 settimane e comunque fino a quando per 3 volte non si vedono più lendini. Non è necessario tagliare i capelli. Il bambino può tornare a scuola dopo l'avvio di un idoneo trattamento disinfestante, verificando sempre l'assenza di lendini e presentando il certificato rilasciato dal proprio medico.


PREVENZIONE DELLE REINFEZIONI

- Lavare in lavatrice (60°) o a secco gli indumenti e la biancheria del letto utilizzati nelle 48 ore precedenti dal soggetto infestato.
- Sigillando tutti gli oggetti che non possono essere lavati in buste di plastica per 2 settimane.
- Lavando i pettini e le spazzole con acqua calda (a 60°) saponata.



COME SI PUÒ EVITARE IL CONTAGIO ?

- Spiegando ai propri figli di non scambiare gli oggetti personali (cappelli, scarpe, pettini)
- Legando i capelli lunghi (code, trecce)
- Lavando i capelli ai bambini 2 volte alla settimana con un normale shampoo.
- Controllando settimanalmente i capelli dei propri figli, anche asintomatici ed in assenza di casi di pediculosi (il controllo va fatto in condizioni di buona illuminazione e con la lente di ingrandimento)
- Segnalando all'insegnante la probabile infestazione



In caso di sospetto è necessaria la visita presso il proprio medico per l'eventuale conferma diagnostica

Il Responsabile della Pediatria di Comunità

Dott. Alessandro Volta